


Eledura™

Arylex™ active

HERBICYD

Wszechstronne rozwiązanie do ochrony zboż ozimych



ELEDURA™ Precyzja w eliminacji chwastów

Doświadczania ścisłe – finalna ocena wiosenna



Fot. Rafał Kowalski

Kontrola

Eledura™ 2,5 l/ha + tribenuron 75 WG 8 g/ha

Kompleksowe rozwiązanie herbicydowe dla zbóż ozimych.

Eledura™ to zaawansowany herbicyd o działaniu układowym, zaprojektowany do powszchadowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w okresie jesiennym. Dzięki unikalnej kompozycji trzech substancji czynnych, preparat stanowi skuteczną odpowiedź na narastający problem odpornych biotypów chwastów, np. miotły zbożowej, chabry bławatkowej, zapewniając czystość plantacji w krytycznych fazach wzrostu.

Dlaczego Eledura™ stanowi filar nowoczesnej agrotechniki?

- **Synergia trzech odmiennych mechanizmów działania:** wykorzystanie różnych grup chemicznych minimalizuje ryzyko selekcji odporności.
- **Skuteczność wobec biotypów odpornych:** skuteczna eliminacja chwastów wykazujących odporność na inhibitory ALS oraz ACCase.
- **Wczesna eliminacja konkurencji:** możliwość zastosowania już od fazy szpilkowania (BBCH 10–14)* zabezpiecza potencjał plonotwórczy rośliny uprawnej.
- **Szerokie spektrum zwalczanych gatunków:** jeden zabieg eliminuje uciążliwe chwasty wschodzące jesienią.


Spektrum zwalczanych agrofagów

Eledura™ wykazuje wysoką efektywność eliminacji najważniejszych chwastów zbóż:

- **Chwasty jednoliściennne:** miotła zbożowa (w tym biotypy odporne).
- **Chwasty dwuliściennne:** chaber bławatek, fiolek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, przeczelnik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, tobołki polne.

Zastosowanie w uprawach: preparat posiada szeroką rejestrację w kluczowych gatunkach zbóż ozimych: pszenicy, pszenicy, życie oraz jęczmieniu.

Zaawansowana technologia ochrony i strategia antyodpornościowa POTRÓJNE UDERZENIE W CHWASTY



Fundamentem skuteczności Eledura™ jest optymalne połączenie substancji o uzupełniających się mechanizmach działania:

1. **Prosulfokarb** – hamuje syntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach.
2. **Diflufenikan** – działa kontaktowo i rezydualnie, hamując biosyntezę karotenoidów.
3. **Arylex™ active** – innowacyjna syntetyczna auktyna z nowej grupy chemicznej (arylopikolnowe).

Optymalizacja terminu aplikacji

Dla uzyskania maksymalnej efektywności zabiegu, rekomenduje się stosowanie preparatu w fazie: **BBCH 11–13 (1–3 liście właściwe zbóż)**.

Wczesna eliminacja chwastów (faza siewek) pozwala na:

- **Niezakłócony rozwój systemu korzeniowego zbóż przed spoczynkiem zimowym.**
- **Efektywniejsze wykorzystanie zasobów wodnych i nawożenia azotowego przez roślinę uprawną.**
- **Lepsze przygotowanie plantacji do przetrzymywania.**

Termin stosowania, dawka

Jesienią, powschodowo

W celu uzyskania najlepszych efektów, rekomendowany termin aplikacji, to faza: 1-3 liście zbóż (BBCH 11-13)

Eledura™

Arylex™ active

od 2,5 l/ha

BBCH: 11-13



Bezpieczeństwo w płodozmianie i elastyczność

Eledura™ charakteryzuje się szybkim rozkładem mikrobiologicznym, co zapewnia bezpieczeństwo roślinom następczym w normalnym cyklu płodozmianowym.

- **Brak ograniczeń** dla większości roślin następczych wysiewanych wiosną.
- **Uwaga:** W przypadku konieczności likwidacji plantacji jesienią, po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę ozimą i jęczmień ozimy.

Parametry techniczne produktu

Cecha	Specyfikacja
Skład	prosulfokarb (667 g/l), diflufenikan (14 g/l), Arylex™ active (1,33 g/l), sejfner
Formulacja	EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)
Zalecana dawka	od 2,5 l/ha
Ilość cieczy roboczej	200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie	średniokropliste

Dlaczego Eledura™?

1. Zawiera 3 substancje aktywne (w tym Arylex™ active) o 3 odmiennych mechanizmach działania oraz sejfner.
2. Zwalcza miotłę zbożową i kluczowe chwasty dwuliścienne (przytulię czepną, mak polny, chabra bławatka, chwasty rumianowate, przetaczniki, bodziszki i inne chwasty).
3. Szerokie okno aplikacji jesienią (BBCH 10-14).*
4. Rejestracja we wszystkich gatunkach zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto).
5. Bezproblemowy dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji.
6. Zwalcza chwasty odporne (chaber bławatek, miotła zbożowa) na herbicydy o innym mechanizmie działania (np. sulfonilomoczniki).

Eledura™ – Twój sposób na bezkompromisową czystość zbóż już jesienią!

* rekomendowany termin aplikacji, to faza 1-3 liście zbóż (BBCH 11-13).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.