

# Dragster™ Pak

HERBICYD



**Dragster™ Pak to wyjątkowy pakiet dwóch herbicydów: Dragster™ i Diablo™ 306 SE z adjuwantem Dassoil™, który zwalcza szeroki zakres chwastów jedno- i dwuliściennych w kukurydzy powschodowo.**

## Unikalny skład:

rimsulfuron [grupa 2 wg HRAC]

tifensulfuron metylu [grupa 2 wg HRAC]

florasulam [grupa 2 wg HRAC]

2,4-D 2-EHE [grupa 4 wg HRAC]


+ sejfner.

## Termin stosowania i zalecane dawki:

**Dragster™ 135 g/ha  
+ Diablo™ 306 SE 0,33 l/ha  
+ Dassoil™ 0,5 l/ha**

## Korzyści:

- Dzięki unikalnemu składowi bez trudu eliminuje chwasty jedno- i dwuliścienne po wschodach kukurydzy, znacznie ułatwiając Ci prowadzenie plantacji
- Skuteczny i elastyczny
- Niezawodny partner w ochronie kukurydzy, na którym możesz polegać



Skala BBCH

Stosować wiosną, od 2 do 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)

# Zakres zwalczanych chwastów oraz skuteczność w doświadczeniach w Polsce i w Europie

CHWASTY	Dragster™ + adjuwant
<b>CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE</b>	
Chwastnica jednostronna	+++
Palusznik krwawy	+++
Perz właściwy	+++
Włośnica zielona	+++
<b>CHWASTY DWULIŚCIENNE</b>	
Gorczyca polna	+++
Gwiazdnica pospolita	+++
Jasnota purpurowa	+++
Komosa biała	+++
Maruna nadmorska	+++
Przytulia czepna	+++
Rdest plamisty	+++
Rdest ptasi	+++
Rdestówka powojowata	+++
Samosiewy rzepaku	+++
Szarłat szorstki	+++
Tobolki polne	+++
<b>Skuteczność: +++ bardzo dobra</b>	

## Dlaczego warto wybrać Dragster™ Pak?

- Kompletnie rozwiązanie do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.
- Szerokie okno aplikacji: od 2 do 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).
- Zawiera 4 uznane substancje aktywne o dwóch odmiennych mechanizmach działania oraz sejfner chroniący kukurydzę.
- Zwalcza trudne chwasty w kukurydzy (m.in. chwastnicę jednostronną, włośnicę, perz właściwy, komosę białą, marunę bezwoną, szarłat szorstki, rdestówkę powojowatą).
- Odporność na zmywanie przez deszcz: zaledwie 2 godziny od zabiegu.

- Szeroki dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji.
- Gotowe rozwiązanie w korzystnej cenie; zestaw na 3 ha.

## Następstwo roślin:

Po zastosowaniu Dragster™ Pak wiosną i zbiorze kukurydzy można uprawiać:

**jesienią:** zboża,

**wiosną kolejnego roku kalendarzowego:**

buraki cukrowe, groch, jęczmień jary, lucernę, pomidory, rzepak jary, słonecznik, soję, ziemniaki.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem, po minimum 3 tygodniach od wykonania zabiegu Dragster™ Pak można uprawiać: kukurydzę.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.